

Pluteus coccineus (Cooke) Masseur - štítovka šarlatová

(*Pluteus coccineus* [Cooke] Masseur in Čechoslovakia)

Dr František Šmarda — Ing. Karel Kříž

Z u s a m m e n f a s s u n g

Die Verfasser beschreiben eine seltene, für die Tschechoslovakei neue Art von *Pluteus coccineus* (Cooke) Masseur, welche zum erstenmale 17. VII. 1954 in Südmähren am Berge Děvičky bei Dolní-Věstonice (Bezirk Nikolsburg) gesammelt wurde. Später sammelten ihn die Verfasser noch einigemale im Jahre 1954 und 1955, in den Monaten Juli, August, Oktober und November. Er wuchs einzeln, oder in kleineren Gruppen auf Strünken von *Tilia cordata* Mill., *Ulmus carpini-folia* Gled., *Fraxinus excelsior*. Der Wald ist ein alter, schattiger, gegen Norden exponierter Niederwald der Gesellschaft *Querceto-Carpinetum tilietosum*; das geologische Substrat ist Kalkstein. Die Lokalität befindet sich im Gebiete der Polauer Berge, mit einer Durchschnittstemperatur von 9,0 °C, jährlichem Gesamtniederschlag von 522 mm, Regenfaktor 56.