

O variabilitě rodových znaků u imperfektních rodů *Fusarium* Link a *Cephalosporium* Corda

Über die Variabilität der Gattungsmerkmalen bei den Nebengattungen der imperfekten Pilze *Fusarium* Link und *Cephalosporium* Corda.

Olga Fassatiová

Na základě studia monosporických kultur imperfektních druhů *Fusarium moniliforme* Sheld. a *Cephalosporium* sp., izolovaných housenek *Pyrausta nubilalis* Hübn., bylo prokázáno, že způsob tvoření mikrokonidií u imperfektního rodu *Fusarium* Link je stejný jako u rodu *Cephalosporium* Corda. Diskutováno o hodnotě morfologických znaků imperfektních hub ze skupiny *Hyphomycetes* a o nových možnostech jejich systematického třídění.

Auf Grund des Studiums von monosporischen Kulturen der Nebenarten *Fusarium moniliforme* Sheld. und *Cephalosporium* sp., welche aus den Raupen von *Pyrausta nubilalis* Hübn. isoliert worden waren, wurde nachgewiesen, dass die Mikrokonidien bei der Nebengattung *Fusarium* Link und *Cephalosporium* Corda auf dieselbe Weise entstehen. Es wird über den taxonomischen Wert von morphologischen Merkmalen der imperfekten Pilze aus der Gruppe *Hyphomycetes* und über die neuen Möglichkeiten ihrer systematischen Gliederung diskutiert.