

Nové rody vyšších hub II

Nova genera macromycetum II

Zdeněk Pouzar

1. Autor popisuje čtyři nové rody: *Suillosporium* Pouz. (typ: *Pellicularia cystidiata* Rogers), *Coniobotrys* Pouz. (typ: *Coniophora ochroleuca* Bres. in Brinkm.), *Leucogyrophana* Pouz. (typ: *Merulius molluscus* Fr.) a *Setchelliogaster* Pouz. (typ: *Secotium tenuipes* Setchell).

2. Bavlnová modř, použitá při barvení výtrusů čeledi *Coniophoraceae* Nannfeldtem a John Erikssonem (1953) byla nahrazena se stejným výsledkem kresylovou modří.

3. U druhu *Setchelliogaster tenuipes* (Setchell) Pouz. je popsáno zelené barvení kresylovou modří.

1. Four new genera are described: *Suillosporium* Pouz. (type: *Pellicularia cystidiata* Rogers), *Coniobotrys* Pouz. (type: *Coniophora ochroleuca* Bres. in Brinkm.), *Leucogyrophana* Pouz. (type: *Merulius molluscus* Fr.) and *Setchelliogaster* Pouz. (type: *Secotium tenuipes* Setchell).

2. Cotton blue, used for staining of spores in the family *Coniophoraceae* Donk. by Nannfeldt and John Eriksson (1953) is replaced by the same effect by cresyl blue.

3. In *Setchelliogaster tenuipes* (Setchell) Pouz. is described a green coloration in cresyl blue.