

Imperfektní houby parazitující na vyšších houbách

Parasitische Deuteromyceten auf höheren Pilzen

Olga Fassatiová

Na kloboukatých houbách byly sbírány v Podkrkonoší, Pošumaví a Čes. Středohoří v letech 1956 a 1957 tyto imperfektní druhy hub: *Sepedonium chrysospermum* (Bull.) Fries, *Mycogone rosea* Link, *Verticillium lactarii* Peck, *V. agaricinum* Corda, *V. niveostratosum* Lindau, *Diplocladium minus* Bonord., *D. majus* Bonord. a *Amblyosporium botrytis* Fres. Na *Tubercularia vulgaris* Tode byl nalezen imperfektní druh *Acrostalagmus parasitans* Corda. U druhu *Diplocladium majus* Bonord. byly v umělé kultuře sledovány sterilní pyknidy.

Auf den Hutpilzen wurden im Riesengebirgsvorlande und im Böhmerwaldgebiete, sowie im Böhmischem Mittelgebirge in den Jahren 1956 und 1957 folgende Deuteromyceten gesammelt: *Sepedonium chrysospermum* (Bull.) Fries, *Mycogone rosea* Link, *Verticillium lactarii* Peck, *V. agaricinum* Corda, *V. niveostratosum* Lindau, *Diplocladium minus* Bonord., *D. majus* Bonord., und *Amblyosporium botrytis* Fres. Auf *Tubercularia vulgaris* Tode wurde *Acrostalagmus parasitans* Corda vorgefunden. In der künstlichen Kultur von *Diplocladium majus* Bonord. wurden sterile Pykniden beobachtet.