

Poznámky k revisi padlí (Erysiphales) na *Ribes* L. a *Grossularia* A. Rich.

Einige Bemerkungen zur Kenntnis der Erysiphaceen auf Stachelbeeren
und Johannisbeeren

Vladimír Skalický a Běla Niederlová

(Z Katedry botaniky biologické fakulty univ. Karlovy v Praze)

V našem sdělení pojednáváme o *Sphaerotheca mors-uvae* (Schwein.) Berk. a o *Microsphaera grossulariae* (Fr.) Berk. nejen po stránce fytopathologické, ale také po stránce nomenklatorické a o *Leveillula saxifragacearum* Golovin f. *ribis* Golovin na *Ribes* sp. z Tadžikistanu.

Dalším parazitem z čeledi *Erysiphaceae* na rybízích je *Phyllactinia guttata* (Wallr. ex Fr.) Lév. V C o r d o v ě sběru v herbářích katedry botaniky UK jsme našli toto padlí na *Ribes rubrum*. Je to první nález *Phyllactinia guttata* (Wallr. ex Fr.) Lév. na *Ribes rubrum*.

In dieser Arbeit sind folgende Mehltauarten besprochen: *Sphaerotheca mors-uvae* (Schwein.) Berk., *Microsphaera grossulariae* (Fr.) Berk., *Leveillula saxifragacearum* Golov. f. *ribis* Golovin und *Phyllactinia guttata* (Wallr. ex Fr.) Lév. Wir haben erstmals *Phyllactinia guttata* (Wallr. ex Fr.) Lév. auf *Ribes rubrum* L. im Herbariummateriale identifiziert. Es ist der zweite Fund in Europa (erster auf Stachelbeeren von Léveillé gesammelt).