

Výsledky mykologického výzkumu Čech za rok 1958

II. Kritické poznámky k některým diskomycetům zimního a jarního aspektu mykoflory středních Čech.

Resultate der mykologischen Durchforschung Böhmens für das Jahr 1958

II. Kritische Bemerkungen zu einigen Discomyceten der Winter- und Frühjahrsaspekt der mittelböhmischen Mykoflora.

Mirko Surček

V této druhé části Výsledků uvádím výběr některých diskomycetů, které jsem sbíral v zimním a časně jarním období roku 1958 ve středních Čechách a jež jsou buď novými taxony (*Phialea brunneofibrillosa* sp. n., *Velutaria megaspora* sp. n., *Ascobolus albidus* f. *macrosporus* f. n.) nebo jsou přeřazeny do jiných rodů (*Cistella acuum* [Alb. et Schw. ex Fr.] c. n.) nebo jsou nové pro naše území (pro ČSR: *Monilinia johnsonii* [Ell. et Ev.] Honey, *Cistella aphanes* [Rehm in Strasser] Nannf., *Peizizella vulgaris* [Fr.] Höhn., pro Čechy: *Rutstroemia elatina* [Alb. et Schw. ex Fr.] Rehm.) Dále připojuji poznámky k několika dalším, vesměs vzácnějším nebo méně známým druhům.

In diesem zweiten Teile der Resultate wird eine Auswahl einiger Discomyceten angeführt, die der Autor im Winter und Frühjahr des Jahres 1958 im Mittelböhmen gesammelt habe und die entweder neue Taxone sind (*Phialea brunneofibrillosa* sp. n., *Velutaria megaspora* sp. n., *Ascobolus albidus* f. *macrosporus* f. n.) oder für unseres Gebiet neue sind (für die Tschechoslowakei: *Monilinia johnsonii* [Ell. et Ev.] Honey, *Cistella aphanes* [Rehm in Strasser] Nannf., *Peizizella vulgaris* [Fr.] Höhn., für das Böhmen: *Rutstroemia elatina* [Alb. et Schw. ex Fr.] Rehm) oder in andere Gattungen übergereicht wurden (*Cistella acuum* [Alb. et Schw. ex Fr.] c. n.). Zu den einigen weiteren, vielfach selteneren oder weniger bekannten Arten werden Bemerkungen angeknüpft.