

# Několik poznámek k novým nálezům některých imperfektních druhů ze skupiny Hyphomycetes

Neue Funde von imperfekten Pilzen aus der Hyphomyceten-Gruppe

Olga Fassatiová

V článku jsou uvedeny nové nálezy imperfektních hub, které byly sbírány v Československu po prvé. Z parazitických a semiparazitických jsou to: *Acrostalagmus fungicola* Preuss na *Stemonitis fusca* Roth., *Fusidium parasiticum* Westendorp na *Aleuria aurantia* (Pers.) Fuck., *Gibellula leiopus* (Vuill.) Mains na pavouku, *Dendrostibella byssina* (Alb. et Schw.) Höhn. na *Mycena* sp., *Tripospermum juglandis* (Thüm.) Hughes na *Salix* sp. Mezi saprofytické druhy patří nálezy: *Tritirachium dependens* Limber a *Myrothecium verrucaria* (Alb. et Schw.) Ditmar ex Fr.

Im Artikel sind neue Funde von imperfekten Pilzen aus der Gruppe Hyphomyces angeführt, welche in der Tschechoslovakei zum erstenmale gesammelt wurden. Von parasitischen und semiparasitischen Pilzen sind es: *Acrostalagmus fungicola* Preuss auf *Stemonitis fusca* Roth., *Fusidium parasiticum* Westendorp auf *Aleuria aurantia* (Pers.) Fuck., *Gibellula leiopus* (Vuill.) Mains auf einer Spinne, *Dendrostibella byssina* (Alb. et Schw.) Höhn. auf *Mycena* sp., *Trichospermum juglandis* (Thüm.) Hughes auf *Salix* sp. Unter die saprofytischen Pilzen gehören die Funde von Nebenarten: *Tritirachium dependens* Limber und *Myrothecium verrucaria* (Alb. et Schw.) Ditmar ex Fr.