

Méně známé, vzácné a nové druhy ryzců ČSR VII.

Lactarii čechoslovaci rariores vel novi VII.

Zdeněk Schaefer

V článku autor popisuje tři řidce se vyskytující ryzce, které pravděpodobně byly již dříve popsány pod jinými jmény. 1. *Lactarius cookei*, blízký *Lactarius picinus* Fr., byl Cookem pod tímto jménem zobrazen v Illustrations of British Fungi. 2. *Lactarius echinosporus* představuje druh, tvořící spojovací článek mezi *Lactarius vellereus* Fr. a *Lactarius resimus* Fr., pravděpodobně velmi blízký *Lactarius deceptivus* Peck. 3. *Lactarius subtomentosus*, spojující vlastnosti *Lactarius helvus* Fr. a *Lactarius ichoratus* Fr., byl pravděpodobně zobrazen Cookem v Illustrat. pod jménem *Lactarius tomentosus* Otto.

In dem Artikel sind drei seltene Lactariusarten beschrieben, die wahrscheinlich unter verschiedenen Namen schon von älteren Autoren beschrieben wurden. 1. *Lactarius cookei*, der nahe dem *Lactarius picinus* Fr. steht, von Cooke unter diesen Benennung in Illustration of British Fungi abgebildet wurde. 2. *Lactarius echinosporus* bildet eine Verbindungsart zwischen *Lactarius vellereus* Fr. und *Lactarius resimus* Fr. Er nähert sich dem *Lactarius deceptivus* Peck. 3. *Lactarius subtomentosus* verbindet die Eigenschaften des *Lactarius helvus* Fr. und *Lactarius ichoratus* Fr. und wurde wohl als *Lactarius tomentosus* Otto in Cookes Illustrations dargestellt.