

# O pavučinci *Cortinarius (Phlegmacium) subarquatus* Moser

De *Cortinario (Phlegmacio) subarquato* Moser

*Albert Pilát*

Ve skoro čisté smrčtině na „Malé Svaté Hoře“ u Mníšku v Čechách jsem našel 4. VI. 1961 na dvou různých místech dvě plodnice zajímavého pavučince, který je pravděpodobně totožný s *Phlegmacium subarquatum* Moser. Liší se pouze zřetelnou hygrofáností klobouku a blíží se proto v tomto ohledu houbě, kterou popisuje a vyobrazuje Lange pod jménem *Cortinarius allutus* a kterou Moser (1960) označuje jako rozdílný druh: *Phlegmacium subhygrophanicum* Moser. Naše houba má však v mládí lupeny a hořejší část třeně nafialovělé.

---

In piceto nudo in colle „Malá Svatá Hora“ prope Mníšek, Bohemiae, 4. VI. 1961 locis duobus duo carposomata *Cortinarii (Phlegmacii)* e sectione *Scauri* legi, quae probabiliter cum *Phlegmacio subarquato* Moser 1960 identica sint. A typo solum pileo distincte hygrophano discrepant et ideo hac natura fungo, quem Lange 1938 sub nomine *Cortinarii alluti* descripsit et illustravit (= *Phlegmacium subhygrophanicum* Moser 1960), accedunt. Fungus noster primum lamellas et partem stipitis superiorem subviolaceas habet, qua de causa *Phlegmacio subarquato* Moser accedit. Specimina bohemiae describuntur et iconibus arte photographica depictis illustrantur.