

# Studie československých bedel (Lepioteae Fayod) II.

## Studia Lepiotarum (trib. Lepioteae Fayod) Čechoslovakiae, pars II.

(S barevnou tabulí č. 47)

Josef Herink

V první části práce autor studuje *Lepiota hispida* (Lasch) Gill., kterou přijímá ve smyslu N. Patouillarda jako drobnovýtrusný druh sekce *Echinatae* Fayod em. Kühner. Podává popis všech druhových vlastností houby a uvádí její zeměpisné rozšíření se zvláštním zřetelem k Československu. Vystavuje také novou formu, *f. ionobasis*.

Ve druhé části práce autor zpracovává stejným způsobem druh sekce *Stenosporae* Lange, *Lepiota grangei* (Eyre) Kühner.

---

Auctor operis praesentis duae species *Lepiotarum* modo monographico tractat: *Lepiotam hispidam* (Lasch) Gill. et *Lepiotam grangei* (Eyre) Kühner.

*Lepiota hispida* (Lasch) Gill. species vario modo interpretata per lapsum temporis paene omitta est. Auctor hanc speciem in sensu N. Patouillardii accipit sicut speciem sectionis *Echinatae* Fayod em. Kühner, statura minore, sporis minusculis ellipsoideis, velo universali e cellulis globosis catenulatis compositio, acie lamellarum homomorpha (sine cellulis marginalibus). Auctor characteres essentialia macro- et micro-morphologicos, biochemicos et oecologicos fungi describit, formam ejus novam (ionobasem) aedificat et distributionem geographicam indicat (praesertim in Čechoslovakia, ubi 9 localitates adhuc registratae sunt).

Eodem modo *Lepiota grangei* (Eyre) Kühner, species sectionis *Stenosporae* Lange, tractata est. Species in octo localitatibus Čechoslovakiae collecta est.