

Rozšíření pavučince fialového v Československu

Cortinarius violaceus (L. ex Fr.) Fr. in Českoslovakia

(S barevnou tabulí č. 52)

Albert Pilát

V článku je podán nástin zeměpisného rozšíření pavučince fialového v Československu. Tento druh, který je nomenklatorickým typem rodu pavučinec, se vyskytuje roztroušeně skoro v celém mírném pásu severní polokoule. Ve střední Evropě je vzácný. V Československu byl posud zjištěn pouze v jižních a zčásti také ve středních Čechách. Roste zde převážně na půdách kyselých a je doprovázen hercynskou florou. Pouze tři známé lokality v Čechách spadají do oblasti květeny ponticko-pannonské: Prokopské údolí v Praze, kde byl tento druh jen jednou nalezen (PR 196396), dubiny u Chlumce nad Cidlinou, odkud jej uvádí J. Velenovský (1921) a Obrubce u Mladé Boleslavi, 240 m n. m., kde jej v listnatém lese (dub, bříza, osika) 11. IX. 1960 a 13. VIII. 1961 sbíral J. Herink.

Distributio geographica *Cortinarii violacei* (L. ex Fr.) Fr. in Českoslovakia traditur. Haec species conspecta, quae typus nomenclatoricus generis *Cortinarius* Fr. est, fere in tota zona moderata hemisphaerae septentrionalis dispersè occurrit. In Europa Centrali rara est. In Českoslovakia solum in Bohemia meridionali et pro parte etiam in Bohemia centrali adhuc collecta est. In solis acidis praevalenter invenitur et flora hercynica comitatur. Solum tres localitates, in Bohemia notae, in pago florum pontico-pannonicarum iacent: valis St. Procopii Pragae, ubi solum semel lecta est (Pr 196396), querceta adulta prope Chlumec supra rivum Cidlina (haud procul flumen Albim), unde hanc speciem J. Velenovský citat (1921) et Obrubce, distr. Mladá Boleslav, 240 m s. m., ubi eam in silva frondosa (*Quercus robur*, *Betula pendula*, *Populus tremula*) 11. IX. 1960 et 13. VIII. 1961 J. Herink legit.