

## Kožešník moravský — *Xerocomus moravicus* (Vacek) Herink

Etude sur le *Xerocomus moravicus* (Vacek) Herink

(S barevnou tabulí č. 54)

Josef Herink

(Věnováno památce zvěčnělých mykologů Václava Vacka a Aloise Procházky)

V mykologické literatuře je od r. 1924 znám *Boletus tumidus* v pojetí významného francouzského mykologa E. Peltereaua. *Boletus tumidus* Fr., málo známý a kritický druh hřibů, byl však v r. 1942 F. Kallenbachem ztotožněn s formou se silně naduřelým třeněm kožešníku hnědého, *Xerocomus badius* (Fr.) Kühn. ex Gilb. Kallenbachovo stanovisko považují za přesvědčivě zdůvodněné. Peltereauův hřib musí tedy obdržet jiné jméno. Protože je s ním totožný *Boletus moravicus*, popsáný v r. 1946 českým mykologem V. Vackem, musí správné jméno tohoto druhu být *Boletus moravicus* Vacek. Zarážují tento druh do rodu kožešník-*Xerocomus* Quél. (což učinil již E. J. Gilbert, avšak v jiné kombinaci) a vytvářím pro něj zvláštní sekci, *Moravici* sect. nov., v tomto rodu. Podávám podrobný popis houby podle hojného svěžího materiálu, porovnaného s autorovým typem, a popisují její novou formu (*f. pallescens* f. n.).

La littérature mycologique connaît, depuis 1924, un *Boletus tumidus* Fr. au sens de l'éminent mycologue français, E. Peltereau. Plus tard, le *Boletus tumidus* Fr., espèce peu connue et critique, a été pris par F. Kallenbach (1942) pour une des formes de *Xerocomus badius* (Fr.) Kühn. ex Gilb., forme à stipe très renflé. L'auteur a accepté les arguments persuasifs donnés par Kallenbach. Le bolet de Peltereau doit donc porter un autre nom, celui de *Boletus moravicus* Vacek, décrit en 1946 par le mycologue tchèque V. Vacek, qui lui est identique. L'auteur transfère cette espèce dans le genre *Xerocomus* Quél., comme l'a fait déjà E.-J. Gilbert (sub *Xerocomus tumidus*). Il donne une étude de cette jolie espèce, en décrit une forme nouvelle (*f. pallescens* f. n.) et établit pour elle une section spéciale dans le genre *Xerocomus* (sect. *Moravici* sect. nov.).