

Staronový choroš *Tyromyces gloeocystidiatus* Kotl. et Pouz. — bělochoroš nahořklý

Tyromyces gloeocystidiatus Kotl. et Pouz. sp. nov. — A Name for an Old
Polypore

František Kotlaba a Zdeněk Pouzar*)

Autoři popisují nový druh chorošů *Tyromyces gloeocystidiatus* Kotl. et Pouz. sp. nov., vyznačující se gloeocystidami v hymeniu a hořkou chutí, který nebyl dosud správně pojmenován a je znám zatím v literatuře nejčastěji pod jménem *Polyporus trabeus* Rostk. s. Bres. a Bourd. et Galz. Srovnávají rozlišovací znaky nejbližše příbuzných druhů, hlavně *Tyromyces fragilis* (Fr.) Donk, závěrem uvádějí rozšíření *T. gloeocystidiatus* a jeho lokality podle dokladů v československých herbářích.

The authors describe a new species of polypore, *Tyromyces gloeocystidiatus*, characterized by gloeocystidia in the hymenium and bitter taste, which has been previously placed under *Polyporus trabeus* Rostk. s. Bres. and Bourd. et Galz. in the literature. A comparison of diagnostic characters is made with similar species, chiefly *Tyromyces fragilis* (Fr.) Donk, and the paper concludes with the distribution of *T. gloeocystidiatus* and a list of localities based on material preserved in Czechoslovak herbaria.