

## O rozšíření hlívy pozdní-*Pleurotus serotinus* (Pers. in Hofmann ex Fr.) Kummer v Československu

Pleuroti serotini (Pers. in Hofmann ex Fr.) Kummer distributio geographica  
in Cechoslovakia

(K barevné tabuli č. 55)\*)

Albert Pilát

Autor pojednává o rozšíření hlívy pozdní v Československu na základě zjištěných lokalit. Tento poměrně vzácný druh byl sbírán u nás dosud jen na nečetných nalezištích, jež jsou vyjmenována a zakreslena na připojené mapě. V Československu se tato houba vyskytuje skoro pravidelně na listnatých dřevích, a ačkoliv jde o dřevní houbu, vyskytuje se skoro výhradně na půdách kyselých ve studenějších a vlhčích krajích, kde je doprovázena hercynskou flórou. Sleduje u nás hlavně podhorské bučiny, a to i tam, kde byly nahrazeny smrkovými monokulturami a kde se dnes vyskytují buky jen sporadicky. Častá je také na různých druzích olší. Na jiných listnatých dřevinách je vzácnější (habr, jasan, dub, bříza). Směrem k severu Evropy její hojnosti přibývá. Protože však jižní polovina Čech je chladnější a vlhčí než severní, je odtamtud znám největší počet nálezů. R. Singer ve druhém vydání své knihy „The Agaricales in modern taxonomy“ (1962) ji řadí do podrodu *Serotinia* (Pilát) Singer rodu *Panellus* Karst. Protože se od ostatních druhů rodu *Panellus* Karst. subg. *Panellus* značně liší, navrhuji zařadit ji do samostatného rodu *Sarcomyxa* P. Karsten, kam ji již r. 1891 tento autor zařadil.

Distributio geographica *Pleuroti serotini* (Pers. ex Hofmann ex Fr.) Kummer in Cechoslovakia traditur. Localitates adhuc notae huius speciei sat raras enumerantur et in charta geographica memorae proditae sunt. In Cechoslovakia hic fungus ad ligna arborum frondosarum paene semper invenitur et quamquam ille lignicola solis acidis et in regionibus frigidioribus et humidioribus invenitur floraque hercynica comitur. Fageta montana praevalenter sequitur et id illuc, ubi hodie fageta *Piceae excelsae* monoculturis resarcita sunt et ubi arbores *Fagi sylvaticae* solum disperse apparent. Haud raro etiam ad ligna specierum diversarum generis *Alnus* (*Alnus glutinosa*, *A. incana*, *A. viridis*), rarius ad ligna *Fraxini*, *Carpini*, *Quercus* et *Betulae* invenitur. Ad Europae septentriones hic fungus crebrius obiit, sed in Bohemia id haud manifestum est. Bohemiae dimidium meridionale enim frigidior et humidior est, quam dimidium boreale, qua de causa haec species in Bohemia meridionali crebrius invenitur. R. Singer in editione secunda sui libri „The Agaricales in modern taxonomy“ (1962) hanc speciem in subgenus *Serotinia* (Pilát) Singer generis *Panellus* Karst. inseruit. Sed species caeterae generis *Panellus* Karst. subg. *Panellus* a specie nostra manifeste distant. Ergo auctor proponit speciem commemoratam in genus separatum *Sarcomyxa* P. A. Karst., ubi iam anno 1891 hunc fungum P. A. Karsten inseruit. Diagnosis revisa huius generis adiuncta est.