

**Boreální ohňovec rezavohnědý — *Phellinus ferrugineofuscus*
(P. Karst.) Bourd. — nalezen v Československu**

The boreal Polypore *Phellinus ferrugineofuscus* (P. Karst.) Bourd. collected
in Czechoslovakia

František Kotlaba*)

Autor popisuje severský choroš *Phellinus ferrugineofuscus* (P. Karst.) Bourd., který je ve střední Evropě nejvýš vzácný, podle materiálu ze dvou prvních československých nálezů ze Západ. Tater (Liptovské hole) v Karpatech a Boubínského pralesa na Šumavě. Zabývá se rovněž ekologií a rozšířením tohoto zajímavého druhu, který roste hlavně na severu v Severní Americe, Asii (Sibiř) a v Evropě, kde má hlavní rozšíření rovněž na severu, a to ve Skandinávii (Švédsko, Finsko) a v Estonské SSR. Lokalita v Boubínském pralesu v Československu je nejjihnější dosud zjištěným nalezištěm *Phellinus ferrugineofuscus* (P. Karst.) Bourd. v Evropě vůbec. Je připojen podrobný seznam lokalit tohoto druhu v Evropě podle literatury a revidovaných dokladů v herbářích H, O, PR, S, U (= UPS!) a W.

The author describes *Phellinus ferrugineofuscus* (P. Karst.) Bourd., which is extremely rare in Central Europe, from the first two collections in Czechoslovakia: Západní Tatry (Liptovské hole) in the Slovakian Carpathians and the Boubín Virgin Forest at Šumava in Bohemia. The ecology and distribution of this interesting species is discussed. The fungus grows chiefly in northern or mountainous forest in North America, Asia and Europe, where its main distribution is in Scandinavia (Sweden, Finland) and the Estonian SSR. The Boubín Virgin Forest is the most southern locality of *Phellinus ferrugineofuscus* so far known in Europe. A detailed list of localities based on the literature and examination of exsiccata in Herb. H, O, PR, S, U (= UPS!) and W is appended.