

Notes on two new species of the genus *Tarichium* Cohn (Entomophthoraceae)

Dva nové druhy rodu *Tarichium* Cohn (Entomophthoraceae)

Jaroslav Weiser*)

In addition to the known *Tarichium megaspermum*, Cohn, *T. phytonomi* Jaczewski, *T. jaczewskii* Zaprometov, *T. cleoni* Lakon, *T. bereschkoveanum* Lavrov et Smirnova, *T. richteri* Bres. et Star., *T. cimbicis* Lakon and *T. dissolvens* Lakon new species *Tarichium pustulatum* sp. nov. on *Barathra brassicae* (L.) and *Tarichium gammae* sp. nov. on *Agrotis segetum* L. (D. et S.) and *Plusia gamma* are described from Czechoslovakia. Both differ in surface structures of the exosporium of resting spores.

K osmi známým druhům rodu *Tarichium*, *Tarichium megaspermum* Cohn, *T. phytonomi* Jaczewski, *T. jaczewskii* Zaprometov, *T. cleoni* Lakon, *T. bereschkoveanum* Lavrov et Smirnova, *T. richteri* Bres. et Star., *T. cimbicis* Lakon a *T. dissolvens* Lakon připojen popis dvou nových druhů: *Tarichium pustulatum* sp. nov. na housenkách *Barathra brassicae* (L.) a *Tarichium gammae* sp. nov. na housenkách *Agrotis segetum* L. (D. et S.) a *Plusia gamma* obě z Československa. Oba druhy se odlišují povrchovými strukturami na episporiu trvalých spor.