

Studies in the Taxonomy of the Polypores I.

Studie o systematicke chorošů I.

Zdeněk Pouzar*)

Some amendments to the terminology of hyphal morphology and hyphal systems are discussed. The following new genera are proposed: *Anomoporia* Pouz. (type: *Poria bombycina*), *Wrightoporia* Pouz. (type: *Poria lenta*), *Podofomes* Pouz. (type: *Polyporus corrugis*) and *Leptotrimitus* Pouz. (type: *Polyporus semipileatus*). *Polyporus subcartilagineus* Overh. is reduced to the synonymy of *Parmastomyces kravtzevianus* (Bond. et Parm. in Parm.) Kotl. et Pouz.

Návrh některých změn a doplňků v terminologii a v soustavě hyfové morfologie a hyfových systémů. Popis následujících nových rodů: *Anomoporia* Pouz. (typ: *Poria bombycina*), *Wrightoporia* Pouz. (typ: *Poria lenta*), *Podofomes* Pouz. (typ: *Polyporus corrugis*) a *Leptotrimitus* Pouz. (typ: *Polyporus semipileatus*). *Polyporus subcartilagineus* Overh. je zařazován do synonymiky druhu *Parmastomyces kravtzevianus* (Bond. et Parm. in Parm.) Kotl. et Pouz.