

Viröse Mikrokefalie bei *Laccaria* sp. und weiteren Pilzarten

Mikrokefalie virového původu u *Laccaria* sp. a dalších druhů hub

Ctibor Blatný

Die viröse Mikrokefalie, beschränkt auf einzelne Mikrolokalitäten, war im Bez. Č. Lípa im Jahre 1965 häufig bei *Laccaria laccata* (Scop. ex Fr.) Cooke. Im J. 1958 wurde sie bei dieser Art auch in Südböhmen festgestellt. Vereinzelt oder nur bei kleinen Gruppen stellte man sie im J. 1965 im Bez. Č. Lípa auch bei *Laccaria amethystina* (Bull. ex Mérat) Murrill fest. Bei *Cantharellus infundibuliformis* (Scop.) Fr. hat man die Mikrokefalie im Bez. Vlašim an einigen Mikrolokalitäten in den Jahren 1964 und 1965 gefunden.

Virová mikrokefalie, omezená na určité mikrolokality, byla v okrese Česká Lípa v r. 1965 častá u *Laccaria laccata* (Scop. ex Fr.) Cooke. V roce 1958 byla zjištěna u tohoto druhu též v jižních Čechách. Ojedinele nebo u malých skupin byla zjištěna v r. 1965 v okrese Česká Lípa též u *Laccaria amethystina* (Bull. ex Mérat) Murrill. U *Cantharellus infundibuliformis* (Scop.) Fr. byla mikrokefalie na některých mikrolokalitách v okrese Vlašim zjištěna v r. 1964 a 1965.