

# Psivka Ravenelova — *Mutinus ravenelii* (Berk. et Curt.) E. Fischer v Československu

*Mutinus ravenelii* (Berk. et Curt.) E. Fischer in Cechoslovakia

Jan Kuthan a Jaroslav Veselský

Psivka Ravenelova, rostoucí velice vzácně v Severní Americe, byla v Evropě až dosud nalezena jenom na jediné lokalitě, a to v Berlíně-Lichterfelde v zahrádce mezi plevelí r. 1942 a 1943. Tento druh jsme v letech 1964 a 1966 našli i v Československu na dvou lokalitách: v Hradci u Opavy v zámecké zahradě na humosní půdě pod bukem a v Ostravě na nádvoří kamenouhelného dolu „Jan Šverma“ v kyprém humusu mezi plevelí (dvouzubec černoplodý, lopuch menší, mochna husí, pětour maloúborný). Československé nálezy dokonale souhlasí s popisem Pilátovým ve Flora ČSR-Gasteromycetes z roku 1958. Od nejbližší příbuzné psivky obecné se liší hnilobně mršinným zápachem v dospělosti, který setrvává i po usušení plodnic, a nosičem relativně tlustším, více zaobleně kyjovitým a živě malinově červeným, který se směrem dolů zužuje a vybledá.

*Mutinus ravenelii* (Berk. et Curt.) E. Fischer in America boreali rarissime distributus et in Europa adhuc semel in horto in Berlin-Lichterfelde anno 1942 et 1943 observatus nunc etiam in Cechoslovakia ab auctoribus lectus est: primum anno 1964 in horto castelli Hradec u Opavy ad terram humosam sub *Fago*; secundum in area fodinae carbonum lapideorum „Jan Šverma“ dictae in Ostrava ad terram humosam inter ruderalia (*Bidens melanocarpus*, *Arctium minus*, *Potentilla anserina*, *Galinsoga parviflora*). Fungus commemoratus optime cum descriptione A. Pilati (1958) in Flora ČSR-Gasteromycetes concordat. A *Mutino canino* (Huds. ex Pers.) Fr. difert gleba matura penetranter putride foetida (etiam in exsiccatis) et receptaculo relativiter crassiori, apice obtuse acutato et deorsum attenuato, sicut fructus *Rubi idaei* rubro et deorsum exalbicante. (Specimina in PR).