

# Pevník rozpraskaný — *Xylobolus frustulatus* (Pers. ex Fr.) P. Karst. — v Čechách

*Xylobolus frustulatus* (Pers. ex Fr.) P. Karst. in Bohemia

František Kottaba\*)

Pevník rozpraskaný roste výhradně na mrtvém dubovém dřevu a působí typickou voštinovitou hnilobu (německy „Rebhuhnholz“). Podle dosud známých lokalit se zdá, že tento zajímavý druh má v Evropě subkontinentálně-submediterránní rozšíření. Tomu také nasvědčuje rozšíření *Xylobolus frustulatus* v Československu: ve východní (karpatské) části, tj. na Slovensku, je hojný hlavně v jižních a středních oblastech, kdežto v západní části, tj. v Čechách a na Moravě, je velmi vzácný. Dnes známe z Čech celkem 12 lokalit. Naleziště u Petrohradu poblíž Jesenice a u Červeného Hrádku poblíž Jirkova jsou nejzápadnější československé lokality pevníku rozpraskaného (obě cca 13°27' vých. délky); Ferdinandov u Hejnice (Frýdlantu) je nejsevernější lokalitou (50°52' sev. šířky) tohoto druhu nejen v Československu, ale asi i ve střed. Evropě.

---

*Xylobolus frustulatus* (= *Stereum frustulosum*) grows exclusively on dead oak wood and causes a typical pocket-rot (“Rebhuhnholz” in German). According to the localities so far known, this interesting species has a subcontinental-submediterranean distribution in Europe. The testimony of this fact is demonstrated in the distribution of *Xylobolus frustulatus* in Czechoslovakia: in the eastern (Carpathian) part, i.e. Slovakia, it is abundant in the southern and central districts, whereas in the western part, i.e. Bohemia and Moravia, it is very rare. At the present time, this species is known in Bohemia from 12 localities. The localities at Pethrohrad near Jesenice and Červený Hrádek near Jirkov (both cca longitude 13° 27' E.) are today the most western known for *Xylobolus frustulatus* in Czechoslovakia; Ferdinandov near Hejnice (Frýdlant) (latitude (50°52'N.) is the most northern locality of this species not only in Czechoslovakia, but also probably in Central Europe.