

Studies in the Taxonomy of the Polypores III

Studie o systematice chorošů III*)

Zdeněk Pouzar**)

The new genus *Strangulidium* Pouz. is proposed for two species, *S. sericeo-molle* (Romell) Pouz. (= *Polyporus sericeo-mollis* Romell) and *S. rennyi* (Berk. et Br.) Pouz. (= *Polyporus rennyi* Berk. et Br.). The genus *Chaetoporus* P. Karst. is subdivided to two sections, *Chaetoporus* and *Cyanochaetoporus* Pouz. The nomenclature of *Polyporus aurantiacus* Rostk. and *Polyporus nitidus* (Pers.) ex Fr. is discussed, the new species *Chaetoporus separabilimus* Pouz. is described and two new combinations *Hapalopilus salmonicolor* (Berk. et Curt.) Pouz. and *Chaetoporus collabens* (Fr.) Pouz. are proposed.

Popisuje se nový rod *Strangulidium* Pouz. pro dva druhy, *S. sericeo-molle* (Romell) Pouz. (= *Polyporus sericeo-mollis* Romell) a *S. rennyi* (Berk. et Br.) Pouz. (= *Polyporus rennyi* Berk. et Br.). Rod *Chaetoporus* P. Karst. je rozčleněn ve dvě sekce, *Chaetoporus* a *Cyanochaetoporus* Pouz. Je probírána nomenklatura druhů *Polyporus aurantiacus* Rostk. a *Polyporus nitidus* (Pers.) ex Fr., popisuje se nový druh *Chaetoporus separabilimus* Pouz. a jsou navrženy dvě nové kombinace *Hapalopilus salmonicolor* (Berk. et Curt.) Pouz. a *Chaetoporus collabens* (Fr.) Pouz.