

Příspěvek k poznání operkulátního diskomycetu *Sepultaria speluncarum* (Velen.) Svr.

Contribution to the classification of *Sepultaria speluncarum* (Velen.) Svr.

Jiří Moravec

Je pojednáno o nálezech *Sepultaria speluncarum* (Velen.) Svr. v okolí Mladé Boleslavi a uveden popis podle vlastních sběrů. Druh byl původně popsán Velenovským (1934) jako *Humaria speluncarum* Velen., později Svrčkem (1962), přerazen do rodu *Sepultaria*, kam právem náleží. Je známa z několika lokalit v Československu. Autor se domnívá, že *Humaria bolaris* Bres. je s tímto druhem totožná, což by však mohlo být s jistotou potvrzeno jen revisí Bresadolova typu.

Localities and description of *Sepultaria speluncarum* (Velen.) Svr. from the Mladá Boleslav district (Central Bohemia) are given. *S. speluncarum* was originally described by Velenovský (1934) as *Humaria*, but was transferred to the genus *Lachnea* (Fr.) Gill. by Svrček (1948), and later (1962) to the genus *Sepultaria* (Cooke) Masee, which seems to be the most correct position. Several localities are known in Czechoslovakia. The name *Sepultaria speluncarum* is mentioned because it is so known from Czechoslovakia. It is evident that *Humaria bolaris* Bres. is identical with our fungus and has priority. Confirmation of this fact can be obtained only by re-examining the type of *Humaria bolaris* Bres.