

Phellinus pilatii sp. nov., ein sehr schädlicher Parasit an Populus alba L. und Populus canescens Smith

Ohňovec Pilátův — *Phellinus pilatii* sp. nov., velmi škodlivý parazit
na topolech *Populus alba* L. a *Populus canescens* Smith

Alois Černý

Phellinus pilatii Černý sp. nov. ist eine Pilzart der nördlichen gemässigten Zone, welche bisher an mehreren Lokalitäten in den südlichen Teilen der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik und in Ungarn festgestellt wurde. Von ihrem nächsten Verwandten, *Phellinus everhartii* (Ellis et Gall.) A. Ames, unterscheidet sie sich durch andere Färbung der Basidiosporen und ihre Grösse, Anwesenheit von langen Tramaspinulaen in den Röhrenwänden, durch die Bildung imperfekter Fruchtkörper und die sehr verschiedenen Wirtsholzarten.

Phellinus pilatii Černý sp. nov. — ohňovec Pilátův je druh severního mírného pásu, který byl dosud zjištěn na mnoha lokalitách v jižní části ČSSR a v Maďarsku. Od nejbližší příbuzného druhu *Phellinus everhartii* (Ellis et Gall.) A. Ames se liší jinou barvou basidiospor a jejich velikostí, přítomností dlouhých tramálních set ve stěnách rourek, tvorbou imperfektních plodnic a značně odlišnými hostitelskými dřevinami.