

Bolinia tubulina (Alb. et Schw. ex Fr.) Sacc. v Československu

**Bolinia tubulina (Alb. et Schw. ex Fr.) Sacc. in der Tschechoslowakei
gefunden**

Mirko Svrček

Je pojednáno o nálezech *Bolinia tubulina* v Československu. Tento vzácný stromatický pyrenomycet byl dosud nalezen na dvou lokalitách v Čechách a jedné lokalitě na Slovensku. Vyskytuje se u nás na padlých kmenech smrkových (vzácně jedlových) v horských pralesových rezervacích. Je uveden popis podle nalezeného materiálu a zmíněno světové rozšíření. Rod *Bolinia* (Nitschke) Sacc. se vyznačuje peritheciemi zúženými v dlouhý krk a ponořenými různě hluboko ve stromatu. Tím se liší od ostatních příbuzných rodů, především *Camarops* P. Karst., *Hypoxylon* Bull. ex Fr., a *Nummularia* Tul.

Der Autor berichtet über Funde von *Bolinia tubulina* in der Tschechoslowakei. Dieser seltene stromatische Pyrenomycet wurde bisher nur an zwei Lokalitäten in Böhmen und an einer Lokalität in der Slowakei festgestellt. *Bolinia tubulina* kommt bei uns auf liegenden Fichte-, selten Tannenstämmen vor und zwar in Gebirgsurwäldern einiger Naturschutzgebiete. Die genaue Beschreibung von *Bolinia tubulina* wird nach dem Sammelmateriale durchgeführt, ebenso wird die Synonymik und Verbreitung des Pilzes angegeben. Die Gattung *Bolinia* (Nitschke) Sacc. zeichnet sich durch die sogenannten „mehrreihigen“, d. i. in verschiedener Tiefe ins Stroma eingesenkten, zu langem Halse verjüngten Perithezien aus und ist darin von anderen verwandten Gattungen, wie *Camarops* P. Karst., *Hypoxylon* Bull. ex Fr. und *Nummularia* Tul., verschieden.

Bolinia tubulina (Alb. et Schw. ex Fr.) Sacc. v Československu

**Bolinia tubulina (Alb. et Schw. ex Fr.) Sacc. in der Tschechoslowakei
gefunden**

Mirko Surček

Je pojednáno o nálezech *Bolinia tubulina* v Československu. Tento vzácný stromatický pyrenomycet byl dosud nalezen na dvou lokalitách v Čechách a jedné lokalitě na Slovensku. Vyskytuje se u nás na padlých kmenech smrkových (vzácně jedlových) v horských pralesových rezervacích. Je uveden popis podle nalezeného materiálu a zmíněno světové rozšíření. Rod *Bolinia* (Nitschke) Sacc. se vyznačuje peritheciemi zúženými v dlouhý krk a ponořenými různě hluboko ve stromatu. Tím se liší od ostatních příbuzných rodů, především *Camarops* P. Karst., *Hypoxylon* Bull. ex Fr., a *Nummularia* Tul.

Der Autor berichtet über Funde von *Bolinia tubulina* in der Tschechoslowakei. Dieser seltene stromatische Pyrenomycet wurde bisher nur an zwei Lokalitäten in Böhmen und an einer Lokalität in der Slowakei festgestellt. *Bolinia tubulina* kommt bei uns auf liegenden Fichte-, selten Tannenstämmen vor und zwar in Gebirgsurwäldern einiger Naturschutzgebiete. Die genaue Beschreibung von *Bolinia tubulina* wird nach dem Sammelmaterial durchgeführt, ebenso wird die Synonymik und Verbreitung des Pilzes angegeben. Die Gattung *Bolinia* (Nitschke) Sacc. zeichnet sich durch die sogenannten „mehrreihigen“, d. i. in verschiedener Tiefe ins Stroma eingesenkten, zu langem Halse verjüngten Perithezien aus und ist darin von anderen verwandten Gattungen, wie *Camarops* P. Karst., *Hypoxylon* Bull. ex Fr. und *Nummularia* Tul., verschieden.