

On the typification of the genus *Ascophanus* Boud. (Pezizales)

O typifikaci rodu *Ascophanus* Boud. (Pezizales)

Zdeněk Pouzar and Mirko Surček

The authors typify the genus *Ascophanus* Boud. with the species *Ascophanus granuliformis* (P. Crouan et H. Crouan) Boud. The lectotypes hitherto selected of this genus, viz. *Ascophanus subfuscus* (P. Crouan et H. Crouan) Boud. and *A. carneus* (Pers. ex Pers.) Boud. appear to be inappropriate; *A. subfuscus* is an inoperculate species which feature is in contradiction with the original diagnosis of the genus *Ascophanus* Boud. Because of its spore-ornamentation, *Ascophanus carneus* (Pers. ex Pers.) Boud. was considered an exceptional element in this genus by Boudier himself. Thus *Coprotus* Korf et Kimbrough appears to be a synonym of *Ascophanus* Boud. The present authors disagree with the opinion that the species of the genus *Ascophanus* Boud. are congeneric with the genus *Thelebolus* Tode ex Fr. both for nomenclatural and taxonomic reasons.

Autoři typifikují rod *Ascophanus* Boud. druhem *Ascophanus granuliformis* (P. Crouan et H. Crouan) Boud. Až dosud vybrané lektotypy tohoto rodu, tj. *Ascophanus subfuscus* (P. Crouan et H. Crouan) Boud. a *A. carneus* (Pers. ex Pers.) Boud. se jeví jako nevhodné; *A. subfuscus* je druh inoperkulátní, což je v rozporu s diagnosou rodu *Ascophanus*. *A. carneus* byl již Boudierem vzhledem k ornamentice spor považován za výjimečný zjev v tomto rodu. V důsledku toho se jeví rod *Coprotus* Korf et Kimbrough jako synonymum rodu *Ascophanus*. Autoři se neztotožňují s názorem, že druhy r. *Ascophanus* jsou kongenerické s druhy r. *Thelebolus* Tode ex Fr., a to jak z nomenklatorických, tak i taxonomických důvodů.