

Agaricus bernardii (Quél.) Sacc. in Mongolia

Agaricus bernardii (Quél.) Sacc. v Mongolsku

(Cum tabula no. 82 color. impressa)

Albert Pilát

Specimina *Agarici bernardii* (Quél.) Sacc., quae 7. julio 1971 in Mongolia septentrionali in pede occidentali montium Chentej ca. 1500 m. s. m. auctor collegit, describuntur et coloribus illustrantur. Haec species, ex Europa occidentali descripta, in pratis salinatis in litoribus marium occurit; serius etiam in agris salinatis Hungariae lecta est. Specimina mongolica, ubi hic fungus etiam locis stepposis aliquid salinatis occurit, certe cum speciminibus ex Europa occidentali identica sunt. In Cechoslovakia haec species adhuc non lecta est, nam *Psalliota bernardii*, quam anno 1925 pictor B. Dvořák in ephemeride *Mykologia e Bohemia* illustravit, ad *Agaricum squamuliferum* (Moeller) Pilát var. *caroli* (Pilát) Pilát pertinet. *Agaricus bernardii* sensu Vasilkov (1953) e parte asiatica URSS probabiliter species collectiva est et species affines sectionis *Agaricus* (= Sectio *Campestris* Konr. et Maubl.) amplectit.

Autor popisuje a vyobrazuje exempláře *Agaricus bernardii* (Quél.) Sacc., které nalezl a barevně vyfotografoval 7. VII. 1971 v severním Mongolsku na západním úpatí pohoří Chentej ve výši asi 1500 m. Tento druh, popsáný ze západní Evropy, roste na zasolených lukách při pobřeží moří; později byl také nalezen na slaných půdách v Maďarsku. V Československu nebyl dosud zjištěn, neboť houba, kterou vyobrazil r. 1925 akad. malíř B. Dvořák z Čech, představuje *Agaricus squamuliferus* (Moeller) Pilát var. *caroli* (Pilát) Pilát. *Agaricus bernardii* ve smyslu Vasilkova (1953) je patrně druh kolektivní, který v sobě obsahuje příbuzné druhy sekce *Agaricus* (= Sectio *Campestris* Konr. et Maubl.).