

# Ekologie a rozšíření ohňovce ohraničeného — *Phellinus nigrolimitatus* (Romell) Bourd. et Galz. v Československu

Ecology and distribution of *Phellinus nigrolimitatus* (Romell) Bourd. et Galz. in Czechoslovakia

František Kotlaba\*)

V práci je diskutována ekologie choroby *Phellinus nigrolimitatus* (Romell) Bourd. et Galz., který roste výhradně na velmi starých padlých kmenech jehličnanů, především smrků, v Československu v nadmořské výšce od 760 m do 1800 m. Dále je uvedeno rozšíření tohoto vzácného a zajímavého choroby v Československu, a to hlavně na základě revidovaných dokladů z veřejných i soukromých herbářů. Bylo u nás zjištěno celkem 44 lokalit, které jsou v mapce rozšíření z technických důvodů shrnuty do 35 bodů. Revize typového materiálu *Phellinus torulosus* var. *laricicolus* Pil. 1936 ukázala, že tento choroš je totožný s *Phellinus nigrolimitatus*.

---

The ecology of the polypore *Phellinus nigrolimitatus* (Romell) Bourd. et Galz. is reviewed: it grows in Czechoslovakia from 760 m to 1,800 m above sea level exclusively on very old, fallen trunks of conifers, chiefly Norway spruce (*Picea abies* = *P. excelsa*). The distribution in this country is given for this rare and interesting polypore, mainly based on revised material from public and private herbaria. Fortyfour localities are so far known and, for technical reasons, are shown as 35 dots on the distribution map. A revision of the type material of *Phellinus torulosus* var. *laricicolus* Pil. 1936 demonstrated that this polypore is identical with *Phellinus nigrolimitatus*.