Skupina Lactarius pyrogalus (Bull. ex Fr.) Fr., stirps Pyrogalus

Die Gruppe Lactarius pyrogalus (Bull. ex Fr.) Fr., Stirps Pyrogalus

Zdeněk Schaefer

Druhy ryzců příbuzné *Lactarius pyrogalus* (Bull. ex Fr.) Fr. nejsou podle autorova mínění v dnešní době správně interpretovány. Mají-li se dodržovat stanovené dohody, pak platí jako rozhodující pro posouzení druhů Friesův popis ze Systema mycologicum. Jak popis, tak i udávaná ekologie *Agaricus pyrogalus* neodpovídá dnešnímu pojetí druhu rostoucímu pod lískou. Podobně druh rostoucí pod habrem nebo bukem nelze vztahovat na druh Friesem uváděný pod jménem *Lactarius circellatus,* jak pro umístění ve Friesově systému, tak i pro popis. Autor udává lískový druh této skupiny jako *Lactarius hortensis* Velen. a habrový a bukový jako *Lactarius pyrogalus* (Bull. ex Fr.) Fr. Dále rehabilituje Britzelmayrův druh *Lactarius adscitus* jako taxon s velkými výtrusy; kromě toho uvádí některé odrůdy základních druhů stirps *Lactarius hortensis* Velen. a *Lactarius pyrogalus* (Bull. ex Fr.) Fr. Do skupiny zařazuje i *Lactarius spinosulus* Quél. pro barvu a ornamentiku výtrusů a do jisté míry i pro charakter pokožky klobouku.

Die mit *Lactarius pyrogalus* (Bull. ex Fr.) Fr. verwandten Arten sind in der Gegenwart, wie der Autor vermeint, nicht gut interpretiert. Wenn das festgesetzte Abkommen eingehalten werden soll, dann gelten für die Beurteilung die von Fries angeführten Diagnosen jener Arten, die im Systema mycologicum enthalten sind. Es entspricht weder die Beschreibung, noch auch die im Urteil fragliche Oekologie des *Lactarius pyrogalus* (Bull. ex Fr.) Fr. der heutigen Auffassung der Art als Corylusbegleiter. Ähnlicherweise ist die Auffassung des *Lactarius circellatus* Fr., als einer Art die unter Weiss- und Rotbuchen wächst, nicht ganz berechtigt, da Fries diese Art unter den schleimigen Arten zitiert und ihre Beschreibung nicht voll entspricht. Der Autor führt den den *Corylus*-Begleiter als *Lactarius hortensis* Velen. und den *Carpinus*- und *Fagus*-Begleiter als *Lactarius pyrogalus* (Bull. ex Fr.) Fr. an. Als Taxon mit grossen Sporen lebt wieder eine alte Britzelmayrische Art *Lactarius adscitus* auf. Im Artikel beschreibt der Verfasser einige neue Abarten beider Grundspecien *Lactarius pyrogalus* (Bull. ex Fr.) Fr. und *Lactarius hortensis* Velen. Dieser Stirps zählt der Autor noch *Lactarius spinosulus* Quél. hinzu, da Huthaut und Sporenornamente (Sporenzeichnung) ähnlichen Charakter haben.