

Oudemansiella nigra spec. nov. und ihre phytocönologischen Beziehungen

Oudemansiella nigra spec. nov. a její fytoecenologické vztahy

Heinrich Dörfelt

Die Deutung des Namens *Agaricus (Collybia) stridulus* Fr. auf eine mehrfach in der DDR gesammelte *Oudemansiella*-Art kann nicht aufrecht erhalten werden, weil die Fries'schen Beschreibungen in wesentlichen Merkmalen von dieser *Oudemansiella* abweichen. *Agaricus stridulus* Fr. wird von vielen Autoren auf eine *Melanoleuca*-Art gedeutet. Es ist offensichtlich, dass „*Oudemansiella stridula* (Fr.) Mos.“ neu beschrieben werden muss. Die *Oudemansiella* wird als *O. nigra* spec. nov. beschrieben. Es ist eine Art der Kalkbuchenwälder (des *Cephalanthero-Fagions*). Es sind Fundorte von der Kreideküste Rügens und von Kalkbuchenwäldern Thüringens bekannt.

Jméno *Agaricus (Collybia) stridulus* Fr. není možné vztahovat na druh rodu *Oudemansiella*, který byl vícekrát sbírán v NDR; Friesovy popisy se totiž v podstatných znacích od této houby liší. *Agaricus stridulus* Fr. je mnohými autory považován za druh rodu *Melanoleuca*. Je tedy zřejmé, že „*Oudemansiella stridula* (Fr.) Mos.“ musí být nově popsána jako *Oudemansiella nigra* spec. nov. Je to houba bučin na vápencích (podsvazu *Cephalanthero-Fagion*). Její nálezy jsou známé z křídového pobřeží Rujány a z bučin na vápencovém podkladu v Durynsku.