

**Contributions à l'étude taxonomique des Hyphomycetes
(Deuteromycetes). II. Sur l'identité de deux genres
Acremonium (Link ex Fries) Fries et Acremoniella Sacc.**

Příspěvek k taxonomii skupiny Hyphomycetes (Deuteromycetes).

II. O totožnosti rodů *Acremonium* (Link ex Fries) Fries a *Acremoniella* Sacc.

Bui xuan Dong

Les caractères morphologiques du conidiophore et de la conidie du genre *Acremoniella* Sacc. sont montrés identiques à ceux du genre *Acremonium* (Link ex Fr.) Fr. D'après le Code international de Nomenclature Botanique, *Acremonium* (Link ex Fr.) Fr. est valable. Ce genre est de nouveau décrit. *Acremoniella atra* Sacc. est considérée comme une variété de l'espèce *Acremonium atrum* Cda, et est décrite comme une nouvelle variété.

Bylo zjištěno, že charakter konidioforu a konidie u rodu *Acremoniella* Sacc. je shodný jako u rodu *Acremonium* (Link ex Fr.). Podle mezinárodního Kódu botanické nomenklatury platí jméno rodu *Acremonium* (Link ex Fr.) Fr. Popis tohoto rodu je zde uveden a doplněn. Je popsáno také *Acremonium atrum* Cda var. *saccardoi* var. nov. (syn. *Acremoniella atra* Sacc.).