

Přehled dosud publikovaných druhů hub z Boubínského pralesa na Šumavě

Übersicht den bisher veröffentlichten Pilzarten aus dem Kubani Urwald (Boubín) im Böhmerwald

Jiří Kubička

Jedna z nejstarších a nejhezčích českých pralesních rezervací, prales na úbočí Pažení zvaný Boubínský prales, je mykologicky zkoumán asi od roku 1906 a do dnešního dne tam bylo uskutečněno kolem 50 mykologických exkurzí. Souhrn dosavadních poznatků však nebyl dosud souborně publikován. Autor se proto pokusil shrnout všechny dosud uveřejněné práce a příspěvky o mykoflóře Boubína z dostupné mykologické literatury a uvést je v soulad s dnešními názory na jednotlivé druhy. Z vlastních exkurzí doplnil ekologické poznatky a alespoň povšechné údaje o době výskytu. Provedl tak základní inventarizaci hub Boubínského pralesa, kterou je možno dále doplňovat. Boubínský prales byl chráněn již od roku 1859, leží v nadmořské výšce od 1000 do 1100 m n. m. a je tvořen asociacemi lesních typů *Fago Abieteti* a *Piceeta*.

Einer der schönsten und ältesten tschechischen Naturschutzgebieten, der Kubani-Urwald (Boubín) im Böhmerwald ist schon seit 1906 mykologisch untersucht. Bisher wurden hier rund um 50 mykologische Exkursionen durchgeführt, trotzdem eine umfassende Übersicht der Mykoflora immer noch fehlt. Darum hat sich der Verfasser bemüht die zerstreuten Beiträge aus der bisherigen mykologischen Literatur zusammenzufassen und einige Arten mit den heutigen taxonomischen Ansichten zu vergleichen. Wo nicht angegeben waren, gibt er auch aus eigenen mykologischen Exkursionen die nötigen Angaben über Funddaten und über Ekologie der Pilze an. Damit liegt er auch einen Startpunkt zu weiteren Arbeiten vor. Der Kubani-Urwald wurde schon vom Jahre 1859 geschützt, er liegt in der Meereshöhe zwischen 1000 bis 1100 m und ist mit den Assoziationen der Waldtypen *Fago-Abieteti* und *Piceeta* bepflanzt.