

Nové a málo známé houby rodu *Fusicladium* Bonorden na topolech a vrbě

Neue und wenig bekannte Pilze der Gattung *Fusicladium* Bonorden an Pappeln
(*Populus* L.) und an Weide (*Salix* L.)

Michal Ondřej

V příspěvku uvádí autor na topolu (*Populus* L.) a vrbě (*Salix* L.) tři druhy hub rodu *Fusicladium* Bonorden (*Fungi imperfecti*, *Hyphomycetes*), které tvoří konidie v řetězcích. Tyto druhy byly zjištěny při revizi herbářového materiálu druhů *Pollaccia radiosa* (Lib.) Bald. et Cif. a *Pollaccia saliciperda* (All. et Tub.) v. Arx.

Předložená práce je rozšířením dřívějšího přehledu druhů rodu *Fusicladium* Bonorden (podrodu *Pseudofusicladium* Ondřej), který byl uveřejněn v časopise Česká mykologie (25 : 165—172, 1971).

In dem Beitrag führt der Autor drei Arten der Gattung *Fusicladium* Bonorden (*Fungi imperfecti*, *Hyphomycetes*) an Pappeln (*Populus* L.) und an Weide (*Salix* L.) an, welche bilden die Konidien in Ketten. Diese Arten wurden durch die Revision des Herbarmaterials der Arten *Pollaccia radiosa* (Lib.) Bald. et Cif. und *Pollaccia saliciperda* (All. et Tub.) v. Arx festgestellt.

Die vorliegende Arbeit ist eine Ergänzung der früheren Übersicht über die Arten der Gattung *Fusicladium* Bonorden (Untergattung *Pseudofusicladium* Ondřej), die in der Zeitschrift Česká mykologie (25 : 165—172, 1971) veröffentlicht wurde.