

O rozšíření *Puccinia scillae* Linhart

Über die Verbreitung der *Puccinia scillae* Linhart

Jiří Müller

Dne 26. IV. 1939 našel H. Zavřel *Puccinia scillae* Linh. v lužním lese Žebračka u Přerova a tím ji objevil v ČSSR. Dosud byla publikována Z. Urbanem (1960) z Plešivecké planiny ve Slovenském krasu. 30. III. 1970 našla tuto rez L. Marvanová u ramene Dunaje u Hamuliakova na Slovensku, kde objevila také spermogonie. Autor našel spermogonie i na některých herbářových položkách z NSR. Autor popisuje a vyobrazuje spermogonie *Puccinia scillae*, podává popis rzi, zmiňuje se o její biologii a vypracoval areál rozšíření rzi. Dále hodnotí rozšíření *Puccinia scillae* v závislosti na rozšíření hostitelských rostlin, na klimatu a nadmořské výšce.

Den 26. IV. 1939 fand H. Zavřel die *Puccinia scillae* Linh. im Auenwalde Žebračka bei Přerov und dadurch entdeckte er sie für die ČSSR. Bisher wurde sie von Z. Urban (1960) von der Plešivecká planina im Slowakischen Karste publiziert. Den 30. III. 1970 sammelte diesen Rost L. Marvanová bei einem Flussarme der Donau bei Hamuliakovo in der Slowakei, wo sie auch die Spermogonien entdeckte. Die Spermogonien fand der Autor auch an einigen Herbarbelegen aus der BRD. Der Autor beschreibt und bildet die Spermogonien der *Puccinia scillae* ab, gibt die Beschreibung des Pilzes, erwähnt seine Biologie und arbeitete das Verbreitungsareal des Rostpilzes aus. Weiters wird die Verbreitung der *Puccinia scillae* in Abhängigkeit von der Verbreitung der Wirtspflanzen, von Klima und der Meereshöhe ausgewertet.