

# *Mycena rosea* (Bull.) ex Sacc. et Dalla Costa ist giftig

*Mycena rosea* (Bull.) ex Sacc. et Dalla Costa je jedovatá

Jiří Kubička und Jaroslav Veselský

Für die Art *Mycena rosea* wurde als korrekte Kombination die Bezeichnung *M. rosea* (Bull.) ex Sacc. et Dalla Costa (1917) festgestellt. Bei einem freiwilligen Versuch einer Frau kam es nach dem Genuss von 28 Fruchtkörpern zu mittelschweren muskarinähnlichen Vergiftungssymptomen. Die Unterschiede zwischen *M. rosea* und *M. pura* (Pers. ex Fr.) Kumm. sind also nicht nur morphologische und ökologische, sondern auch pharmakodynamische. *M. pura* enthält psychotrope Indolsubstanzen.

---

Pro druh *Mycena rosea* byla zjištěna správná kombinace a to *M. rosea* (Bull.) ex Sacc. et Dalla Costa (1917). Při dobrovolném pokuse ženy, která požila 28 plodnic tohoto druhu, se objevily středně těžké muskarinové příznaky. Rozdíly proti *Mycena pura* (Pers. ex Fr.) Kumm. jsou tedy nejen morfologické a ekologické, ale i farmakodynamické. *Mycena pura* obsahuje psychotropní indolové substance.