

Notizen zur Gattung *Camarops* (Boliniaceae)

Poznámky k rodu *Camarops* (Boliniaceae)

Růžena Hilber und Oswald Hilber*)

In der vorgelegten Arbeit wird die von Nannfeldt emendierte Gattung *Camarops* P. Karst. vorgestellt. Da in dieser einige Merkmalsgegensätze bestehen, wird *Camarops* in 3 Untergattungen gegliedert: *Camarops* (Typus *C. hypoxyloides* P. Karst.), *Camarops* subgen. *Bolinia* (Nke.) [Typus *C. tubulina* (Alb. et Schw. ex Fr.) Shear] und *Camarops* subgen. *Peridoxylon* (Shear) [Typus *C. petersii* (Berk. et Curt.) Nannf.]. Nach Herbar — und teilweise Frischmaterial werden 4, in Europa vorkommende Arten dieser Gattung beschrieben, diskutiert und mit Abbildungen belegt: *Camarops polysperma*, *C. tubulina*, *C. microspora* und *C. petersii*. *C. microspora* und *C. tubulina* konnten auch in Kultur genommen werden.

V předložené práci je popsán rod *Camarops* P. Karst. Protože se v Nannfeldtově rozšířeném pojetí tohoto rodu vyskytují některé protiklady, je rod *Camarops* rozdělen do 3 podrodů: *Camarops* subgen. *Camarops* (typ *C. hypoxyloides* P. Karst.), *Camarops* subgen. *Bolinia* (Nke.) [typ *C. tubulina* (Alb. et Schw. ex Fr.) Shear] a *Camarops* subgen. *Peridoxylon* (Shear) [typ *C. petersii* (Berk. et Curt.) Nannf.]. Podle herbářového a z části i čerstvého materiálu jsou popsány, diskutovány a vyobrazeny 4 evropské druhy: *Camarops polysperma*, *C. tubulina*, *C. microspora* a *C. petersii*, *C. tubulina* a *C. microspora* byly studovány v kultuře.