

Macrofungi from the West Caucasus

Part I. Aphyllorphoraceous Fungi (Aphyllorphorales, Basidiomycetes)

Makromycety ze západního Kavkazu I. Aphyllorphorales (Basidiomycetes)

Jaroslav Klán and Libuše Kotilová-Kubičková

The material on which the present study is based was collected on two botanical expeditions in 1976 and 1977. Both expeditions were directed to Teberdinskij zapovednik (nature reserve) in the West Caucasus, approximately 100 km south of Čerkessk (Tscherkessk) in the Russian S. F. S. R. 86 macromycetes (*Aphyllorphorales*) are recorded from this area; 18 species are reported for the first time from the Caucasus. A new taxon *Polyporus brumalis* (Pers.) ex Fr. var. *nanus* Klán is described. *Phellinus hippophaëcola* H. Jahn was collected in the Central and East Caucasus.

Makromycety byly sebrány během dvou botanických exkurzí do západního Kavkazu (Těberdinské státní přírodní rezervace), přibližně 100 km jižně od města Čerkessk v Ruské SFSR v letech 1976 a 1977. Z tohoto území bylo zaznamenáno 86 taxonů z řádu *Aphyllorphorales*, z nichž 18 je nových pro Kavkaz. Je popsán nový taxon *Polyporus brumalis* (Pers.) ex Fr. var. *nanus* Klán. *Phellinus hippophaëcola* H. Jahn byl sbírán ve středním a východním Kavkazu.