

# Risspilze der Sektion *Lilacinae* Heim

(Beiträge zur Kenntnis seltener Inocyben. Nr. 19.)

## Vláknice ze sekce *Lilacinae* Heim

(Příspěvky k poznání vzácnějších vlákníc. Část 19.)

Johann Stangl und † Jaroslav Veselský

Es wird hier die morphologisch nicht einheitliche Sektion *Lilacinae* Heim, die von Moser (1967 und 1978) als Gruppe *Obscuri* angegeben wird, in 2 neue Subsektionen getrennt, je nach Verteilung bzw. Anwesenheit der Kaulocyztiden. Die Subsektion *Caulocystidiatae* subsect. nov. umfaßt die stiellobenbereiften Arten: *I. squarrosa* Rea, *I. obscuroides* P. D. Orton, *I. pusio* Karst. und *I. cincinnatula* Kühner. Die Subsektion *Caulo-acystidiatae* subsect. nov. umfaßt die stielunbereiften Arten: *I. ochraceo-violascens* (Britz.) Migula (= ? *I. personata* Kühn.), *I. griseo-lilacina* J. E. Lange, *I. cincinnata* (Fr.) Quél. und *I. obscura* (Pers. ex Pers.) Gill.

---

Morfologicky nejednotná sekce *Lilacinae* Heim, uváděná Moserem (1967 a 1978) jako skupina *Obscuri*, je autory příspěvku rozdělena ve 2 nové subsekte podle přítomnosti kaulocystid na špici třeně. Subsekte s kaulocystidami na špici třeně obsahuje druhy: *I. squarrosa*, *I. obscuroides*, *I. pusio* a *I. cincinnatula* (*Caulocystidiatae*). Subsekte bez kaulocystid pak zahrnuje: *I. ochraceo-violascens* (= ? *I. personata*), *I. griseo-lilacina*, *I. cincinnata* a *I. obscura* (*Caulo-acystidiatae*).