

# Problematika chronické kandidové tonzilitídy u dětí

## Problems of chronic candida tonsillitis in children

Josef Benda a Petr Fragner

Chronické kandidové tonzilitídy (vyvolané vždy jen *Candida albicans*) se v naší sestavě vyskytují u 3 0/0 vyšetřených dětí. Klinický obraz je polymorfní: někdy jsou patrné povláčky na tonzilách, někdy je *C. albicans* v kryptách, mnohdy bez čepů a bez nápadnějších klinických změn. Tonzilektomie je podle našeho názoru nejvhodnějším terapeutickým řešením. Diagnostika není možná bez mykologického vyšetření a současného stanovení zárodků z hlediska kvantitativního a kvalitativního. Za kontrolu slouží výtěr z jazyka. V naší sestavě se kvasinky vyskytly v ústech (na jazyku a/nebo na tonzilách) u 54,7 0/0 dětí, *C. albicans* u 42,7 0/0. Jsou uvedeny všechny mykologické nálezy.

---

Chronic *Candida* tonsillitides (called forth always by *Candida albicans* only) appear in our group in 3 per cent examined children. The clinical picture is polymorphous: sometimes slight furs can be observed on the tonsils, sometimes *C. albicans* is found in the crypts, frequently without plugs or more conspicuous clinical alterations. We consider tonsillectomy the most suitable therapeutical solution. The diagnosis is not possible without mycological examination with simultaneous determination of the germs, both quantitative as well as qualitative. Lingual smears serve as control. In our group yeasts appeared in the mouth (on the tongue and/or the tonsils) in 54,7 per cent children, *C. albicans* in 42,7 per cent children. All mycological findings are given.