

Taxonomické a nomenklatorické poznámky o *Trametes cervina* a *Ganoderma atkinsonii*

Taxonomic and nomenclatural notes on *Trametes cervina* and *Ganoderma atkinsonii*

František Kotlaba a Zdeněk Pouzar

Vzhledem ke změně typifikace mylně pojatých rodových jmen hub (Sydney 1981) je správné používat pro choroše nazývané dříve často *Coriolellus* Murrill jména *Antrodia* P. Karst. Protože druh *Trametes cervina* (Schw.) Bres. patří do tohoto rodu vzhledem k dimitické hyfové soustavě a dalším znakům, navrhují autoři novou nomenklatorickou kombinaci *Antrodia cervina* (Schw.) Kotl. et Pouz. Na základě revize typového materiálu choroše *Ganoderma carnosum* Pat. 1889 bylo zjištěno, že tento druh je totožný s *G. atkinsonii* Jahn, Kotl. et Pouz. 1980, jež se tak stává jeho synonymem.

Regarding the alteration of the typification of misinterpreted generic names (Sydney 1981) it is correct to use the name *Antrodia* P. Karst. for polypores formerly often called *Coriolellus* Murrill. As the species *Trametes cervina* (Schw.) Bres. belongs in this genus because of its dimitic hyphal system and other characters, the authors propose a new nomenclatural combination *Antrodia cervina* (Schw.) Kotl. et Pouz. Following a revision of the type material of the polypore *Ganoderma carnosum* Pat. 1889 it has been ascertained that this species is conspecific with *G. atkinsonii* Jahn, Kotl. et Pouz. 1980, so that the latter becomes its synonym.