

Two new species of *Coprobria* and taxonomic remarks on the genera *Cheilymenia* and *Coprobria* (Discomycetes, Pezizales)

Dva nové druhy rodu *Coprobria* a taxonomické poznámky k rodům *Cheilymenia* a *Coprobria* (Discomycetes, Pezizales)

Jiří Moravec

Two new coprophilous species of *Coprobria* Boud., *C. hyphopila* spec. nov. and *C. sordida* spec. nov. are described from Czechoslovakia. Taxonomic problems of the genera *Coprobria* and *Cheilymenia* Boud. are discussed. Regarding the genus *Cheilymenia*, the author proposes to separate all species with superficial apothecial hairs related to *Cheilymenia theleboloides* from the genus and transfer them to *Coprobria* on the basis of a similar excipular structure and a specific cyanophilic striation of ascospore perispore consisting of extremely low longitudinal ribs. The author considers the striation of the peelable perispore which has been still overlooked or underestimated (together with pustules, warts or folds which sometimes also occur) a very important feature for classification of species of *Coprobria* including all species of *Cheilymenia* with "theleboloides" type of excipulum and hairs. Moreover, the author described and pictured an outstanding ascospore ornamentation which he has found in several other species of *Cheilymenia* which have been considered smooth-spored till now (e.g. *C. ciliata*). One new combination has been made.

Dva nové koprofilní druhy rodu *Coprobria* Boud. — *C. hyphopila* spec. nov. a *C. sordida* spec. nov. — jsou popsány z Československa. Autor navrhuje oddělit od rodu *Cheilymenia* Boud. druhy s povrchovými chlupy blízké příbuzné druhu *Cheilymenia theleboloides* a přeradit je do rodu *Coprobria* na základě podobné stavby excipula a specifické ornamentiky perisporu askospor, sestávající z podélně uspořádaných velmi nízkých žeber. Autor pokládá ornamentiku perisporu askospor, která byla doposud přehlížena nebo podceňována, spolu s různými bradavkami a vráskami, které se rovněž často vyskytují, za velmi důležité znaky při určování a třídění druhů rodu *Coprobria* včetně druhů z blízkého příbuzenstva *Cheilymenia theleboloides* se stejným typem excipula a chlupů. Význačnou ornamentiku perisporu askospor našel autor rovněž u několika dalších druhů rodu *Cheilymenia*, které byly doposud považovány za hladkovýtřusé (např. *C. ciliata*). Je provedeno jedno nové přerazení a diskutovány taxonomické problémy obou rodů.