

Sběry parazitických imperfektních hub rodu *Cercospora* Fres. z území Československa (část III.)

Funde von parasitischen imperfekten Pilzen *Cercospora* Fres. aus der Tschechoslowakei (Teil III.)

Michal Ondřej

V příspěvku jsou uvedeny dosud nepublikované nové sběry hub rodu *Cercospora* Fres., sbírané po roce 1970 na území Československa. Starší sběry byly již publikovány dříve (Ondřej 1969; Ondřej a Zavřel 1971). V období let 1970–1982 bylo nalezeno 39 druhů ve 128 sběrech (z toho na Moravě bylo sbíráno 37 druhů). Veškerý dokladový materiál je uložen v herbářových sbírkách Slovenského národního múzea v Bratislavě. Osm druhů bylo na území Československa sbíráno poprvé (*C. berteroae*, *C. bonjeanae*, *C. bupleuri*, *C. cerasella*, *C. juncina*, *C. lycii*, *C. potentillae* a *C. torilidis*). K nejvíce sbíraným druhům v letech 1970–1982 patří: *C. ferruginea* 17×, *C. zebrina* 16×, *C. dubia* 12×, *C. pastinacae* 10×, *C. radiata* 8×, *C. plantaginis* 7×, *C. microsora* 7×, *C. mercurialis* 6×, *C. depazeoides* 5×, ostatní druhy byly sbírány méně často, tj. 1–4×.

In dem Beitrag sind neue Sammlungen der Gattung *Cercospora* Fres. angeführt, die nach dem Jahre 1970 auf dem Gebiet der Tschechoslowakei gefunden wurden. Die Sammlungen aus den früheren Jahren wurden schon publiziert (Ondřej 1969, Ondřej, Zavřel 1971). In dem Zeitraum 1970–1982 wurden 39 Arten (davon in Mähren 37 Arten) gefunden. Die Herbarbelege sind in den Sammlungen des Slowakischen Nationalmuseums in Bratislava aufbewahrt. 8 Arten wurden auf dem Gebiet der Tschechoslowakei zum erstenmal gesammelt (*C. berteroae*, *C. bonjeanae*, *C. bupleuri*, *C. cerasella*, *C. juncina*, *C. lycii*, *C. potentillae* und *C. torilidis*).