

Reassessment of *Hypoxylon serpens*-complex I.

Rozčlenění komplexu *Hypoxylon serpens* I.

Zdeněk Pouzar

Based on specimens coming mostly from Central Europe, the group of species closely related to *Hypoxylon serpens* (Pers.: Fr.) J. Kickx fil. is newly classified with emphasis on microscopic characters. The *Hypoxylon serpens*-complex is separated from *Hypoxylon* Bull. and classified as a genus of its own, *Nemania* S. F. Gray in a considerably changed circumscription. Eight species are newly transferred to *Nemania*. One species is described as new: *Nemania carbonacea* Pouz. spec. nov. and the problem of *N. atropurpurea* (Fr.) Pouz. is discussed in detail.

Skupina druhů blízce příbuzných *Hypoxylon serpens* (Pers.: Fr.) J. Kickx fil. je nově rozčleněna se zdůrazněním především mikroskopických znaků a to na základě studia materiálů hlavně ze střední Evropy. Tato skupina je vyčleněna z rodu *Hypoxylon* Bull. do rodu *Nemania* S. F. Gray v novém ohraničení. Osm druhů je nově přeřazeno do rodu *Nemania*. Jeden druh je popsán jako nový: *Nemania carbonacea* Pouz. spec. nov., a je podrobněji probrána otázka druhu *N. atropurpurea* (Fr.) Pouz.