

Muchomůrka Beckerova — *Amanita beckeri* Huijsman — v ČSSR

Hellflockiger Scheidenstreifling — *Amanita beckeri* Huijsman — in ČSSR gefunden

Svatopluk Šebek

V předloženém článku autor referuje o dosavadních nálezech muchomůrky *Amanita beckeri* Huijsman [sekcce *Vaginatae* (Fr.) Quél., podsekcce *Inauratae* (Bon) Šebek] v Československu; je uveden její popis, srovnání s příbuznými druhy podsekcce *Inauratae* (Bon) Šebek, zejména s nejbližší příbuznou *A. ceciliae* (Berk. et Br.) Bas, a výčet dosud zjištěných lokalit.

In dem vorgelegten Beitrag sind bisherige Funde des Hellflockigen Scheidenstreiflings (*Amanita beckeri* Huijsman) [Sect. *Vaginatae* (Fr.) Quél., Subsect. *Inauratae* (Bon) Šebek] in ČSSR beschrieben. Die Beschreibung, das Vergleichen mit verwandten Arten der Subsect. *Inauratae* (Bon) Šebek, besonders mit dem nächstverwandten Grauflockigen Scheidenstreifling. [*A. ceciliae* (Berk. et Br.) Bas], und die Aufzählung bisher festgestellten tschechoslowakischen Fundorte dieses geschätzten Pilzes sind beigefügt. In ČSSR wächst der Pilz als Mediterranelement meistens in Eichenwäldern an kalkreichen Standorten, besonders im Böhmischem Karst unweit von Prag. Der Beitrag ist mit Beschreibung einer neu dargestellten taxonomischen Kombination beendet.