

Stereum frustulatum — pevník rozpraskaný, jeho ekologie a zeměpisné rozšíření v Československu

Stereum frustulatum, its ecology and geographical distribution in Czechoslovakia

František Kotlaba

Pevník rozpraskaný roste převážně jako saprofyt především na pařezech a mrtvých ležících kmenech výhradně dubů a výjimečně i jako saproparazit na ještě živých stromech. Je rozšířený pouze na severní polokouli v Evropě, Asii a Sev. Americe od tropů (asijských) do teplých oblastí mírného pásma. V Československu je dosud znám ze 123 lokalit od planárního do nejnižší části montánního stupně, přičemž největší počet lokalit se nachází v kolinním stupni. Pozoruhodné je, že v českých zemích známe pouze 36 lokalit tohoto pevníku, který je zde celkem vzácný (24 lokalit v Čechách, 12 na Moravě), zatímco všechna ostatní naleziště (87) jsou na Slovensku, hlavně v jeho jižní polovině. Seznam československých lokalit a mapa rozšíření jsou připojeny.

Stereum frustulatum occurs mostly as a saprophyte chiefly on stumps and dead fallen trunks of oaks and exceptionally also as a saproparasite on living trees. It is distributed solely in the Northern Hemisphere in Europe, Asia and North America from the tropics (Asian) to the warm areas of the temperate zone. It is known in Czechoslovakia from 123 localities from the lowlands to the lowest parts of the montane belt with the majority of localities in the colline belt (hilly country). It is interesting that in western part of Czechoslovakia this *Stereum* is known from only 36 localities (24 localities in Bohemia, 12 in Moravia), whereas all other localities (87) are in Slovakia, mainly in the southern half. The list of the Czechoslovak localities and map of distribution is provided.