

# Taxonomic notes on *Marasmius anomalus* group (Tricholomataceae)

## Taxonomické poznámky ke skupině *Marasmius anomalus* (Tricholomataceae)

Vladimír Antonín

This paper brings the results of taxonomic studies of *Marasmius anomalus* group (*Basidiomycetes*, *Tricholomataceae*). The length of basidiospores is considered as the most important character in this group. The type-specimens of *Marasmius anomalus* Lasch, *M. epodius* Bres. and *M. epodius* var. *microsporus* (R. Maire) were revised, too. The author considers *Marasmius anomalus*, *M. epodius* and *M. littoralis* Quél. conspecific. A new combination, *Marasmius anomalus* var. *microsporus* (R. Maire) Antonín is proposed.

---

Článek přináší výsledky taxonomického studia komplexu *Marasmius anomalus* (*Basidiomycetes*, *Tricholomataceae*). Za hlavní znak v této skupině je považována délka výtrusů. Byly revidovány také typy *Marasmius anomalus* Lasch, *M. epodius* Bres. a *M. epodius* var. *microsporus* (R. Maire). Na základě těchto studií jsou *Marasmius anomalus*, *M. epodius* a *M. littoralis* Quél. považovány za synonymum. Současně je navržena nová kombinace *Marasmius anomalus* var. *microsporus* (R. Maire) Antonín