

The delimitation of the genus *Leccinum*

Vymezení rodu *Leccinum*

Josef Šutara

The International Botanical Congress in Berlin 1987 accepted a change of Art. 63 of the nomenclatural rules. According to the new, changed wording of Art. 63 the generic name *Leccinum* is now legitimate. This fact is respected by the author of this paper and therefore *Leccinum* is here used as a correct name for the genus in question.

The genus *Leccinum* S. F. Gray (*Boletaceae*) is distinguished from the other boletes by a peculiar arrangement of the surface tissues of the stipe. This peculiar type of the stipe covering is here described. The differences between the stipe coverings of the genera *Leccinum* and *Boletus* Fries are discussed in detail. A list of the examined material with notes on some species is appended. The following new combinations are proposed: *Leccinum depilatum*, *Leccinum fragrans*, *Leccinum luteoporum*, *Leccinum niveum*, *Leccinum pseudoscabrum* and *Leccinum rufescens*.

Mezinárodní botanický kongres v Berlíně 1987 přijal změnu čl. 63 nomenklatorických pravidel. Podle nového, změněného znění čl. 63 je rodové jméno *Leccinum* nyní legitimní. Tato skutečnost je respektována autorem tohoto článku, a proto je tu *Leccinum* používáno jako správné jméno pro zde diskutovaný rod.

Rod *Leccinum* S. F. Gray (*Boletaceae*) je odlišen od ostatních hřibů zvláštním uspořádáním povrchových tkání třeně. Tento zvláštní typ třeněvého pokryvu je zde popsán. Detailně jsou prodiskutovány rozdíly mezi třeněvými pokryvy rodů *Leccinum* a *Boletus* Fries. Je připojen seznam studovaného materiálu s poznámkami k některým druhům. Jsou navrženy následující nové kombinace: *Leccinum depilatum*, *Leccinum fragrans*, *Leccinum luteoporum*, *Leccinum niveum*, *Leccinum pseudoscabrum* a *Leccinum rufescens*.