

Pevník dvoubarvý — *Laxitextum bicolor* (Corticiaceae), jeho ekologie a zeměpisné rozšíření v Československu

Laxitextum bicolor (Corticiaceae), its ecology and geographical distribution
in Czechoslovakia

František Kotlaba

Pevník dvoubarvý roste v Československu jako saprofytní především na buku lesním (60,1 % všech nálezů), mnohem méně na dubech (11,6 %) a jen výjimečně i na řadě jiných dřevin; celkem je u nás známý na 14 různých druzích dřevin. Jednoleté plodnice tvoří od května do listopadu s maximem růstu v srpnu (29,7 % nálezů). Přestože se v ČSSR vyskytuje v nadmořských výškách od 150 m do 1250 m n. m., nejvíce lokalit (49 %) se nalézá v kolinném stupni. Celkem je známo v Československu 106 lokalit pevníku dvoubarvého, a to 40 v Čechách, 20 na Moravě a 46 na Slovensku.

Laxitextum bicolor grows in Czechoslovakia as a saprophyte predominantly on *Fagus sylvatica* (60.1 % of all findings), rarely on oaks (11.6 %) and exceptionally on other hosts; it is known in this country on a total of 14 different tree species. It forms annual carpophores from May to November with the growth maximum in August (29.7 % of all findings). Although its altitudinal occurrence in Czechoslovakia is known to be from 150 m to 1250 m above sea level, the majority of localities (49 %) are in the hill country belt (200—500 m). In Czechoslovakia, *Laxitextum bicolor* is known from 106 localities: 40 in Bohemia, 20 in Moravia, 46 in Slovakia.