

# Ekologie a zeměpisné rozšíření dvou pevníků — *Columnocystis abietina* a *Stereum gausapatum* — v Československu

## Ecology and geographical distribution of two stereoid fungi — *Columnocystis abietina* and *Stereum gausapatum* — in Czechoslovakia

František Kotlaba

*Columnocystis abietina* je známa v Československu téměř výhradně z pařezů a mrtvých kmenů smrku ztepilého a velmi vzácně jedle bělokoré, a to nejméně ze 193 lokalit; největší počet z nich leží v montánním stupni. *Stereum gausapatum* je známé převážně z pařezů, mrtvých (výjimečně i živých) kmenů a větví dubů a velice vzácně i jiných listnatých dřevin; v Československu jej zatím známe z 231 lokalit, z nichž většina leží v pahorkatině.

*Columnocystis abietina* occurs in Czechoslovakia almost solely on stumps and dead trunks of *Picea abies* and very rarely on *Abies alba*; it is known in this country from at least 193 localities, the majority of which is situated in the montane belt. *Stereum gausapatum* occurs in Czechoslovakia primarily on stumps, dead (exceptionally living) trunks and branches of oaks and only very rarely on some other broad-leaved trees; it is currently known in this country from 231 localities, the majority of which is situated in the hilly country belt.