

***Antrodia pini-cubensis*, a new polypore from the Caribbean area**

PETR VAMPOLA¹, FRANTIŠEK KOTLABA² and ZDENĚK POUZAR³

¹Žižkova 87, 586 01 Jihlava, Czech Republic;

²Na Petřinách 10, 162 00 Praha 6, Czech Republic;

³Národní muzeum, Václavské nám. 68, 115 79 Praha 1, Czech Republic

Vampola P., Kotlaba F. and Pouzar Z. (1994): *Antrodia pini-cubensis*, a new polypore from the Caribbean area. – *Czech Mycol.* 47: 189–192

A new polypore *Antrodia pini-cubensis* Vampola, Kotlaba et Pouzar is described from a collection by the second author from Cuba in the Caribbean area. This fungus was reported ten years ago as a new species for Cuba under the incorrect name of *Antrodia oleracea* (Davids. et Lomb.) Ryv. *A. pini-cubensis* forms thin resupinate carpophores with small pores. It grows saprophytically on dead wood of *Pinus cubensis* and causes a brown rot of wood.

Key words: *Antrodia pini-cubensis*, Cuba, polypore

Vampola P., Kotlaba F. a Pouzar Z. (1994): *Antrodia pini-cubensis*, nový druh chorošů z karibské oblasti. – *Czech Mycol.* 47: 189–192

Je popsán nový druh chorošů *Antrodia pini-cubensis* Vampola, Kotlaba et Pouzar podle nálezu druhého z autorů na ostrově Kuba v karibské oblasti. Před 10 lety byla tato houba uvedena jako nový druh pro Kubu pod chybným určením jako *Antrodia oleracea* (Davids. et Lomb.) Ryv. *A. pini-cubensis* tvoří tenké resupinatní plodnice s drobnými póry a roste saprofytický na mrtvém dřevu borovice *Pinus cubensis*. Působí hnědou hnilobu dřeva.