

Notes on the variability of *Gymnopus luxurians* (Tricholomataceae)

VLADIMÍR ANTONÍN¹ and JOSEF HERINK²

¹Moravian Museum, Dept. of Botany,
Zelný trh 6, CZ-659 37 Brno, Czech Republic

²Turnovská 717/3,
CZ-295 01 Mnichovo Hradiště, Czech Republic

Antonín V. and Herink J. (1999): Notes on the variability of *Gymnopus luxurians* (Tricholomataceae) – Czech Mycol. 52: 41–49

The variability of *Gymnopus luxurians* is described in detail. An aberration with distinctly double edged lamellae which are connected to each other, especially when young, is described. This feature, as well as the number of lamellae do not have any taxonomic value. The world distribution of this species is also given.

Key words: Basidiomycetes, Tricholomataceae, *Gymnopus luxurians*, taxonomy, distribution.

Antonín V. a Herink J. (1999): Poznámky k variabilitě druhu *Gymnopus luxurians* (Tricholomataceae) – Czech Mycol. 52: 41–49

Je podrobně rozebrána variabilita druhu *Gymnopus luxurians*. Je popsána odchylka s lupeny se dvěma, v mládí navzájem spojovanými ostřemi. Tento znak, stejně jako hustota lupenů, však nemá žádnou taxonomickou hodnotu. Je rovněž shrnuto celosvětové rozšíření druhu.